

Diagnostic

Les éléments permettant à l'éleveur de reconnaître la maladie : PALPATION

- augmentation de volume (à différentier d'une hernie)
- inflammation et douleur localisée
- cordon qui ne sèche pas
- anorexie

Traitement

Le type de traitement à mettre en œuvre et ses modalités pratiques :

- intervention systématique dès les premiers signes
- traitement local : pour les cordons qui ne sèchent pas (teinture d'iode, acide picrique...)
- traitement général : antibiothérapie longue (5 jours minimum jusqu'à 10 jours) + anti-inflammatoire en cas d'anorexie et/ou de douleur

Les recommandations permettant d'évaluer l'efficacité du traitement :

- nette amélioration des signes cliniques au bout de 24-48 heures
- contrôle du cordon 5 jours après l'arrêt du traitement

Les critères d'alertes devant déclencher l'appel du vétérinaire :

- gonflements articulaires associés
- absence d'amélioration sous 48 heures
- récurrences
- multiplication des cas
- doute sur l'affection (hernie, omphalite)
- persistance des artères ombilicales (1 ou 2)
- hémorragie du cordon
- nombril restant humide en permanence

Prévention

- Hygiène du vêlage
- Qualité de la prise colostrale
- Qualité de la litière pendant les premiers jours
- Vidange du cordon avec les mains propres le plus tôt possible
- Désinfection du cordon : aspersion ou trempage
- Palpation bi-quotidienne du cordon les premiers jours de vie